



٥: تعليمات بخصوص أخذ عينة مكورات عنقودية ذهبية مقاومة للميثيلسين

التجهيز للارسال

لا تنسى كتابة تاريخ أخذ العينة في كل استمارة (٣ أجزاء)




اكتب على اللاصقة المكان الذي أخذت منه العينة وتاريخ أخذها.




الصق السنتيكر والباركود على استمارة الطلب الخاصة على الأنبوب.


توجد في العلبة عصاة صغيرة عليها قطن و٣ أنابيب ناقلية للسوائل.




لف الأنابيب بأورقة الممتصة للسوائل




خذ عينة من الحلق مستعملا نكاشة قطنية جديدة عبر ادخالها في الحلق.
تابع الخطوة ٤ و٥.




افتح العلبة وأخرج العصاة الصغيرة ذات القطن (نكاشة قطنية).




ضع هذه الأنابيب الثلاثة في العلبة البلاستيكية




خذ عينة من العجان مستعملا نكاشة قطنية جديدة من خلال حكها في المنطقة بين كيس الصفن والشرج عند الذكور وبين المهبل والشرج عند الإناث تابع الخطوة ٤ و٥.



خذ مخاط الأنف مستعملا النكاش القطني (العصاة الصغيرة ذات القطن) وذلك من فتحتي الأنف.



ضع علبة التعليل الصغيرة في الكيس البلاستيكي ثم اغلقه.



ضع الاستمارة في جيب صغير اضافي على الكيس البلاستيكي.

سيقدم لك طبيب العائلة الخاص بك معلومات عن تقديم المادة.

افتح الأنبوب وضع فيه النكاشة القطنية. كسر النكاشة القطنية من الجزء الملون اغلق السداد بإحكام.

